

Số: /HD-TTĐVNN

Thanh Hà, ngày tháng 10 năm 2023

HƯỚNG DẪN

Các biện pháp hạn chế và xử lý lộc đông cho cây vải

Do sự biến đổi của khí hậu, thời tiết ấm lên, do độ phì của đất, do chế độ chăm sóc cây hàng năm. Vì vậy khi bước vào mùa đông không tránh khỏi tình trạng cây ra lộc ảnh hưởng rất lớn đến sự ra hoa đậu quả và năng suất vải, đặc biệt trà vải thiều. Để hạn chế cây vải ra lộc đông, xử lý lộc đông và tạo điều kiện cho cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi cần có những biện pháp kỹ thuật tổng hợp để hạn chế thấp nhất tỷ lệ cây không ra hoa của các trà vải. Trung tâm DVNN khuyến cáo một số biện pháp áp dụng các nguyên lý điều tiết sinh trưởng của cây trồng như sau:

1. Sử dụng các biện pháp thủ công cắt tỉa cành tăm, cành vượt, cành sâu trong cây để tạo độ thông thoáng giảm sâu bệnh.
2. Trong suốt thời kỳ từ tháng 10 đến đầu tháng 1 năm sau tùy theo từng trà vải, theo dõi sự sinh trưởng của cây, hạn chế tưới nước cho cây, thực hiện rút nước trong vườn vải để hạn chế sinh trưởng dinh dưỡng, không ra rễ và lộc mới.
3. Xới đất quanh tán: Xới đất quanh tán rộng 40-50 cm xung quanh hình chiếu tán, cuốc sâu 4- 5 cm vừa chạm đầu rễ. Việc xới đất vào đầu đông có tác dụng làm khô đất quanh tán cây, làm giảm độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa.
4. Tuyệt đối không được bón phân, đặc biệt là phân đạm cho đến khi cây nhú mầm hoa.
5. Thực hiện khoanh cành sớm từ tháng 10 trở đi đối với từng trà vải, đối với những cây có bộ lá thành thực và chân đất tốt dùng dao sắc khoanh hết lớp vỏ đến phần gỗ. Có 2 cách khoanh: Khoanh theo hình xoắn ốc 1,2- 1,5 vòng hoặc khoanh vòng tròn. Sau khi khoanh dùng dung dịch Oxycorua đồng 1-3% bôi vào vết khoanh để hạn chế vi khuẩn, nấm xâm nhập và giúp cành chóng liền sẹo.

6. Biện pháp chặn rễ: Khi lộc thu đã thành thực chọn cây có tình trạng sinh trưởng khỏe, khả năng ra lộc đông cao, tiến hành cuộc đứt rễ bằng cách đào rãnh rộng 25-30cm, sâu 20- 25 cm, phía mép tán cắt đứt một số rễ và để phơi nắng tự nhiên 30 đến 40 ngày. Khi lá chuyển màu thì tiến hành bón phân hữu cơ hoai mục xuống rãnh rồi lấp đất lại, chăm sóc bình thường.

7. Dùng phân bón qua lá HPC-22 (ra hoa xanh) với liều lượng 40- 50ml/bình 16lít-18lít phun đều toàn bộ tán cây và phun từ 1-2 lần nhằm hạn chế lộc đông và kích thích sự phân hóa mầm hoa.

- Đối với những cây ra lộc đông vào tháng 11 đầu tháng 12 phải tích cực xử lý bằng các biện pháp thủ công như tuốt lá, ngắt bỏ những cành lộc, thực hiện với những cây tầm thấp. Đối với cây cao dùng HPC-22 pha 80-100ml/ bình 18 lít phun đều khi lộc nhú dài từ 3-5 cm; nếu thời tiết ẩm ẩm phải phun lần 2 thì lá non mới rụng.

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp hạn chế và xử lý lộc đông cho cây vải, đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến các hộ trồng vải trên địa bàn.

Nơi nhận:

- VP UBND huyện;
 - Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;
 - Các phòng ban liên quan;
 - 20 xã, thị trấn;
 - Lưu.
- } Để báo cáo

**TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Cường